

## 2021-22

39	କବଳୀରେ ପତ୍ରଦାଗ ବା ସିଗାଟୋକା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲି ପାଣିରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା ୩୦ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ ନାମକ ଫିଫିନାଶକ ମିଶାଇ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୪ ମାସ ପରେ ୧ ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101014 Advisory Date :-3/13/2022 8:47:13 AM
38	ବାଇଗଣର ଛୋଟପତ୍ର ରୋଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜମିରୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଓପାଡ଼ି ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ କିମ୍ବା ୬୦ ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ କୁ ୨୦୦ ଲି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101014 Advisory Date :-3/12/2022 11:58:59 AM
37	ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଚାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଶୋଷକ ପୋକ ଯଥା ଜଉ ଓ ପତ୍ର ଉକୁଣି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କମ୍ ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲି ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ୩୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍ କୁ ୨୦୦ ଲି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ କିମ୍ବା ୫୦ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ କୁ ୨୦୦ ଲି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 149008 Advisory Date :-3/12/2022 11:55:42 AM
36	ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଚମାଟୋ ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି ପାଇରିପ୍ରୋକ୍ସାଫେନ କିମ୍ବା ୨୫୦ ମି.ଲି ସ୍ପାଇରୋମେସିଫେନ ନାମକ କୀଟନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101021 Advisory Date :-2/9/2022 10:48:14 AM
35	ବାଇଗଣ ଓ ବିଲଡି ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଧଳାମାଛିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮-୧୦ ଟି ହଳଦିଆ ଅଠା ଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତା ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ୍ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101021 Advisory Date :-2/8/2022 5:54:57 PM
34	ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡ ପତା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ କିମ୍ବା ୩୦୦ ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପଟାନ ଓ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ୍ ର ମିଶ୍ରିତ ଫିଫିନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜାନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 148985 Advisory Date :-2/8/2022 4:56:31 PM
33	ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବଉଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ କିମ୍ବା ୪ ଗ୍ରାମ ଏସିମିପ୍ରିଡ ନାମକ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇ ବଉଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଓ ୨ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101021 Advisory Date :-2/2/2022 10:13:07 AM
32	ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ସଲଫର୍ କିମ୍ବା ୩୦୦ ମି.ଲି. ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ୍ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି. ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ କିମ୍ବା ୧୦୦ ମି.ଲି. ପେନକୋନାଜୋଲ୍ ନାମକ ଫିଫିନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 148985 Advisory Date :-2/2/2022 9:59:43 AM
31	ମେଘୁଆ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ଯୋଗୁଁ କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଅଲ୍ଟରନେରିଆ ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ଗ୍ରାମ ମାକ୍ଲୋଜେବ କିମ୍ବା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଓ ମାକ୍ଲୋଜେବର ମିଳିତ ଫିଫିନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101012 Advisory Date :-2/1/2022 4:44:52 PM

30	ସୋରିଷ ଫସଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଉ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୦୦ ମି.ଲି. ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଜଉ ଓ ବିଚିତ୍ର ବଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ ଆୟୋମୋଥୋକ୍ସାମ କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ ଏସିମାମିପ୍ରୋଥ କିମ୍ବା ୨୦ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ନାମକ କୀଟନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବାଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 148985 Advisory Date :-2/1/2022 4:37:01 PM
29	୧୩ ରୁ ୧୫ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚେଣୁ ବିରି, ଫୁଗ, ଚିନାବାଦାମ ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାଳୀ କରନ୍ତୁ ତଥା ଜଳସେଚନ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 148983 Advisory Date :-1/11/2022 1:31:07 PM
28	ଲଙ୍କାମରିଚ ଫସଲରେ ଅଷ୍ଟପଦୀର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. Ethion କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି. Spiromesifen କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି. Propargite କୀଟନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101021 Advisory Date :-1/11/2022 1:21:17 PM
27	ଆଳୁରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଉ ପୋକ ଓ ସବୁଜ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ୍ Azadirachtin କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ Thiamethoxam କିମ୍ବା ୮୦ ଗ୍ରାମ Dinotefuran କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ Flonicamid କୀଟନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101020 Advisory Date :-1/10/2022 12:13:09 PM
26	ପିଆଜ ଚଳିଗୁଡ଼ିକ ୧୨-୧୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚା କିମ୍ବା ୮ ସପ୍ତାହର ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଡଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ ଟନ୍ ସଜା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ୫୨ କି.ଗ୍ରା. ଡିଏପି, ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ, ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ସାର ଏବଂ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ସଲଫର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୧୫ ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଉପର ବେଳା ଡଳି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 101019 Advisory Date :-12/31/2021 1:20:49 PM
25	ହରଡ଼ ଗଛରେ ୭୦-୮୦ ଶତକଡ଼ା ଛୁଇଁଗୁଡ଼ିକ ହଲଦିଆରୁ ବାଦାମି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ଛୁଇଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶୁଖିଗଲେ ମଞ୍ଜି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅମଳ ପରେ ୩-୭ ଦିନ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 148967 Advisory Date :-12/31/2021 1:11:25 PM
24	ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଅମଳ ପରେ ବିଲରେ ଥିବା ପାଳ ବା ନଡ଼ାକୁ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ।
	Total No of Farmer : - 150582 Advisory Date :-12/17/2021 3:15:43 PM
23	ଧାନ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବସ୍ତା ବା କୋଠରୀରେ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସଫାଟ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଏକ ଟନ୍ ପିଛା ୩ଟି (ସମୁଦାୟ ୯ ଗ୍ରାମ) କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖି ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରପୋଲିନ୍ ଭଲଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି କିଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନରୁହେ। ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
	Total No of Farmer : - 148955 Advisory Date :-12/17/2021 3:08:45 PM

22	କମ୍ ଆର୍ତ୍ତତା ବା ଶୁଖିଲା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ ଫସଲ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଚାଷୀଭାଇମାନେ କୋଳଥ, ମୁଗ, ବିରି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ମଟର, ଚିନାବାଦାମ, ମସୁର, ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଆଳୁ ଓ ରାଶି ଆଦି ଅଳ୍ପ ଦିନିଆ ରବି ଫସଲ କରିପାରିବେ ।
	Total No of Farmer : - 148916 Advisory Date :-12/1/2021 12:11:44 PM
21	ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଯଥା- ମଟର, ବିରି, ଖେସାରୀ, ରାଶି, ଅଳସୀ ଓ ପେସି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଫସଲ ହିସାବରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଧାନ କାଟିବାର ୧୦-୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148910 Advisory Date :-11/26/2021 12:42:16 PM
20	ଫୁଲକୋବି ଚାଷରେ ବୋରନ ଅଣୁସାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କି.ଗ୍ରା ବୋରାକ୍ସ ଅଣୁସାର ମୂଳସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 101020 Advisory Date :-11/24/2021 1:17:28 PM
19	ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଟେଲ ପ୍ରତିଶତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩୦ କି.ଗ୍ରା ଗନ୍ଧକ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148905 Advisory Date :-11/24/2021 1:13:34 PM
18	ତଳିଘେରାରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଯୌନ ସମେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% ୮୦୦ ମି.ଲି. ଔଷଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଡ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ ୪% ଜି.ଆର୍ ୪ କେ.ଜି ଔଷଧ କିମ୍ବା କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ ଜି. ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ସମାନ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 101019 Advisory Date :-11/1/2021 4:44:39 PM
17	ଶତକଡା ୮୦ ରୁ ୮୫ ଭାଗ ପାଟିଗଲା ପରେ ଧାନ କାଟି ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ବିହନ ପାଇଁ ୧୨ ଶତକଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ୧୪ ଶତକଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ତ୍ତତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
	Total No of Farmer : - 148866 Advisory Date :-11/1/2021 4:09:44 PM
16	ଧାନ ଫସଲରେ ଗନ୍ଧିପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. ଇଥୋଫେନୋପ୍ରକ୍ସ ୧୦ ଇ.ସି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା ମାଲାଥ୍‌ଅନ ୫ ଡି. ଗୁଣ୍ଡକୁ ସକାଳେ ଏବଂ ପବନ ହେଇନଥିବା ସମୟରେ ସମାନଭାବେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148844 Advisory Date :-10/27/2021 12:30:54 PM
15	ଧାନ ଫସଲରେ କେଣ୍ଡାକଟା ସଂବାଳୁଆ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. କୁଇନାଲଫସ୍ ୨୫ ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୫୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ ଇ.ସି. ଧାନ ବୁଦା ମୂଳରେ ସକାଳ ସମୟରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148859 Advisory Date :-10/27/2021 11:39:32 AM
14	ମାଛମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଓ ପକ୍ଷ ରୋଗ ଏରମୋନାସ ଓ ସିଡୋମୋନାସ ଜୀବାଣୁ ସ୍ଫୁରା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ତୁଟିଆ (କପର ସଲଫେଟ)ର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଛମାନଙ୍କୁ ବୁଡାଇ ଛାଡନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 64199 Advisory Date :-10/26/2021 11:47:01 AM
13	ପିଆଜ ଲଗେଇବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ତଳି ଘରାରେ ତୃଣନାଶକ କ୍ୱିଜାଲୋଫପ ଇଥାଲଲ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
	Total No of Farmer : - 101021 Advisory Date :-10/26/2021 11:41:15 AM
12	ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ପିଆଜକୁ ତଳି ଘରାରେ ଧାଡିରେ ପକାନ୍ତୁ । ପିଆଜ ମଞ୍ଜିକୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ପାଇଁ ୨ ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପଟାନ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

	Total No of Farmer : - 101018 Advisory Date :-10/15/2021 2:50:21 PM
11	ଶୀତଦିନେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ୧ ଏକର ଜଳ ଆୟତନ ଓ ୧ ମିଟର ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ୪୦୦ ମି.ଲି. ସିଫାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
	Total No of Farmer : - 64198 Advisory Date :-10/15/2021 2:40:08 PM
10	ଭାରି ବର୍ଷା ହେତୁ ଧାନ ଫସଲରେ ଅଗାଧି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ରୁ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ସଲ୍ୟୁଫୋର (ଶତକାଠା ୨୦ ଭାଗ ବୋରନ) କିମ୍ବା ୨ ରୁ ୨.୫ ଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ ବ୍ରବିଭୂତ ଗୁଣ୍ଡ ସାର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148788 Advisory Date :-9/30/2021 10:32:58 AM
9	ପନିପରିବା ତଳିଘେରାକୁ ଧଳା ପଲିଥିନରେ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଉଜା ଜମିରେ ଟମାଟୋ, ସହଳ କିସମ ଫୁଲକୋବି ଚାରି ପକାନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 101016 Advisory Date :-9/30/2021 10:15:18 AM
8	ଧାନ ଫସଲ ସାମୟିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ପାଣି କମିଲା ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ ରୁ ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ମୁ୍ୟରେଟ ଅଫ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148786 Advisory Date :-9/30/2021 9:57:24 AM
7	ଅଧିକ ପାଣି ଜମିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପତ୍ର ଆଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ (ସଜାରୋଗ) ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେଲେ ପାଣି କାଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଏଲ କିମ୍ବା ଭାଲିଡାମାଇସିନ କିମ୍ବା ୦.୫ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ + ଟ୍ରାଇଫୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନ ଆଦି କବକ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148737 Advisory Date :-9/22/2021 4:05:35 PM
6	ଧାନ ଫସଲ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ (ୟୁରିୟା) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନୂଆ ପିଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 148748 Advisory Date :-9/22/2021 3:56:31 PM
5	ବର୍ଷା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପନିପରିବା ତଳିରେ ମୂଳପତା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ କାପଟନ କିମ୍ବା ୨.୫ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶାଇ ମାଟି ଓ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 101002 Advisory Date :-9/22/2021 3:50:29 PM
4	ଧାନ ଫସଲରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 12190 Advisory Date :-9/15/2021 9:43:51 AM
3	ଗଭୀର ଓ ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ବୁଣା ଧାନରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 12191 Advisory Date :-9/14/2021 2:44:50 PM
2	ବାଇଗଣରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲୋରୋଥାଲାମିଲ୍ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ + ଅଠା @ ୫ ମିଲି/ ଟାଂକି ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 12177 Advisory Date :-9/14/2021 2:27:11 PM
1	ଉନ୍ନତ ମାନର କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଯଥା କଡକନାଥ,କ୍ରଏଲର ଓ ସୌରାଜି ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 12509 Advisory Date :-4/15/2021 5:28:02 PM